



بیمارستان حضرت آیت‌الله العظمی گلپایگانی (ره)
مدیریت خدمات پرستاری و مامانی



مختصر



زردی نوزادی

neonatal jaundice

تهیه و تنظیم:

واحد آموزش به بیمار و ارتقاء سلامت همگانی

www.golpayegani-h.ir
۰۲۵ ۳۶۱۶۱۱۱

* آیا مصرف ادویه برای مادر ممنوع است؟
استفاده از ادویه‌ها و بهخصوص ادویه‌های تند چون فلفل، التهاب یا تخریب سلول‌های کبدی را همراه دارد. حال اگر مادر ادویه مصرف کنند، این ماده در شیرش ترشح می‌شود و پوست نوزاد رو به زردی می‌گراید.

* در دورانی که کودک دچار زردی می‌شود، باید تغذیه با شیر مادر ادامه داشته باشد، تا کمبود کالری نوزاد جبران شود و هم‌چنین حرکات روده او بهتر شده و زردی از بین برود.

* برخلاف عقاید عامیانه مصرف میوه‌های زرد در دوران بارداری و شیردهی سبب زردی نوزاد نمی‌شود.

آیا دادن آپتیمیمیت یک عوایض ویژه زردی نوزاد است؟

این کار بسیار مضر است و آب قند می‌تواند سبب بالا بردن میزان زردی شود. دادن هرچیز غیر از شیر مادر به نوزاد هیچ کمکی به رفع زردی نکرده و حتی می‌تواند مضر باشد. هر چه نوزاد شیر بیشتری بخورد زردی او سریع‌تر برطرف می‌شود. همچنین استفاده از داروهای گیاهی همچون "ترنجبین" و "شیر خست" و ... به دلیل عوارضی که برای کودکان دارد، ممنوع است.

منبع:

کتاب نلسون، بیماری‌های نوزادان، ۲۰۱۵، ۱۵

*ابتلا به زردی به نوع تغذیه مادر بستگی دارد. تغذیه‌ای که نوزاد پس از تولد قرار است داشته باشد، با تغذیه‌ای که می‌خواهد با شیر مادرش داشته باشد فرق می‌کند. غذایی که مادر از آن استفاده می‌کند، به‌طور مستقیم در شیر او ترشح می‌شود و نوزاد از شیری که حاوی انواع و اقسام مواد است، استفاده می‌کند. هرچه مادر غذای دیر هضم‌تر استفاده کند باعث بروز زردی بیشتر در نوزاد می‌شود.

عوایض عصب اندامی عجیب در طلاق زردی

معمولًا زردی، بیماری جدی‌ای محسوب نمی‌شود و طی یک تا دو هفته بهبود می‌یابد. ولی چنانچه میزان بیلی روبین بالاتر از حد بوده و بدون درمان باقی بماند، بیلی روبین وارد مغز شده و باعث وارد آمدن آسیب‌های جدی به مغز می‌شود.

از عوارض درمان نشدن زردی می‌توان به فلنج مغزی، عقب ماندگی ذهنی، حملات صرعی، اشکال در تعادل حرکتی، ناهنجاری‌های دندانی و ناشنوایی اشاره کرد که دیگر قابل درمان نیستند.



*دخترو پسر از نظر میزان ابتلا به زردی و خطر احتمالی هیچ تفاوتی با هم ندارند. همان طور که گفته شد نارسی، وزن کم بچه و مشکلات تنفسی نوزاد در بروز زردی نقش دارند.

*مدفعو و ادرار بچه های مبتلا به زردی با بچه های دیگر هیچ فرقی ندارد و نمی توان تشخیص از روی ادرار یا مدفوع را ملاک قرار داد، همانطور که گفته شد آزمایش خون بهترین راه است.

بالای سرشن مهتابی پنداشیم؟

اعشه "یو. وی" (U.V) یا "ماوراء بنفس" که از مهتابی های مخصوص ساطع می شود، بیلی روبین های رسوب کرده را شکسته و به قطعات ریز تبدیل می کند. پس از این که بیلی روبین ها به قطعات کوچک تر تبدیل شدند، از راه ادرار دفع می شوند. استفاده از مهتابی تقریباً راهی است که به کاهش طول مدت بستری شدن نوزاد در بیمارستان کمک می کند.

این لامپ های مخصوص در بیمارستان ها و در دستگاه های مخصوص وجود دارند که نوزاد را با چشم بند مخصوص و بدون هیچ لباسی (فقط با پوشک) در دستگاه قرار می دهند.

اولین اثر زردی روی چشم ها می باشد و سفیدی چشم ها به رنگ زرد می گراید. پس از چشم ها روی گونه ها، سپس در صورت نوزاد خودش را نشان می دهد. با پیشرفت زردی (بالا رفتن میزان بیلی روبین خون)، زردی در سینه، پشت و شکم نوزاد بروز می کند. پس از آن انتظار این است که دست ها و پاها در گیر زردی شوند. اما چون میزان گرددش خون در این قسمت ها کمتر است، احتمال بروز زردی در آنها هم کمتر است.

بهترین راه تشخیص زردی آزمایش خون و اندازه گیری میزان بیلی روبین نوزاد است.

تقریباً نوزادی نیست که با زردی به دنیا بیاید. چون تا زمان تولد نوزاد جفت کار کبد را انجام می دهد و زردی را دفع می کند. بیشتر بچه ها یک الی دو روز پس از تولد زردی خود را نشان می دهند. پس از سه الی چهار روز میزان زردی بالا می رود و در روز هفتم یا هشتم تولد میزان زردی به اوچ خود می رسد.



درمان زردی نوزاد با فتووتراپی

مراجعةه کننده ی گرامی ضمن خوش آمد گویی به شما که این مرکز را جهت درمان انتخاب نموده اید و آرزوی بهبودی هرچه سریعتر فرزند دلبندتان؛ این راهنمای جهت اطلاع رسانی به شما تهیه شده است. امید که موثر واقع شود:

زردی (ایکتر) یکی از شایعترین مشکلات و یکی از مهمترین علل بستری نوزادان می باشد. ۶۰٪ نوزادان رسیده و ۸۰٪ نوزادان نارس دچار زردی می شوند.

زردی نوزادان به دلیل تجمع ماده ای به نام "بیلی روبین" در بدن ایجاد می شود.

بعضی از والدین تصور می کند اگر نوزاد در روز اول و دوم زرد نباشد، دیگر دچار زردی (ایکتر) نمی شود. در صورتی که بیشتر موارد زردی ها، از روز سوم تولد به بعد ایجاد می شود.

لذا باید، در روزهای سوم تا پنجم بعد از تولد نوزاد، جهت کنترل زردی نزد پزشک متخصص مراجعه نمایند.

