

نکات لازم پیش از انجام آندوسکوپی

اگر قرار است برای شما آندوسکوپی انجام شود، حتماً به موارد زیر توجه داشته باشید:

۱. در صورتی که به بیماری‌هایی مثل هپاتیت یا ایدز مبتلا هستید، حتماً پیش از انجام آندوسکوپی این موارد را به پزشک خود اطلاع دهید؛ چرا که پزشکان به منظور پیشگیری از انتقال این بیماری‌ها از یک فرد به فرد دیگر، برای مبتلایان به این بیماری‌ها از آندوسکوپ‌های مخصوص این بیماران استفاده می‌کنند.

۲. قبل از انجام هر گونه آندوسکوپی، تمام داروهای مصرفی را به پزشک بگویید، به ویژه درباره داروهای ضدانعقاد مثل: آسپرین، وارفارین و...، ممکن است پزشک ترجیح بدهد یک یا چند روز قبل از انجام آندوسکوپی، بعضی داروهای شما قطع شوند.

۳. اگر به اختلالات خونریزی دهنده مبتلا هستید، حتماً این موضوع را به اطلاع پزشک برسانید تا اقدامات لازم را برای مقابله با خطرات احتمالی مهیا کند.

۴. زمانی که برای انجام آندوسکوپی مراجعه می‌کنید، تمام مدارک پزشکی خود را همراه داشته باشید.

۵. روز انجام آندوسکوپی، به تنها یکی به بیمارستان یا محل انجام آندوسکوپی مراجعه نکنید و حتماً کسی را با خود همراه داشته باشید.

۶. حداقل تا ۸ ساعت بعد از آندوسکوپی نباید رانندگی نمایید.

۷. در آندوسکوپی لازم است بیمار ۶-۱۲ ساعت ناشتا باشد.

۸. برخی اوقات طی انجام آندوسکوپی، نمونه‌هایی از بافت‌های داخلی برداشته می‌شود. این نمونه‌ها توسط بیمار یا توسط پزشک مربوطه به بخش پاتولوژی فرستاده می‌شود تا زیر میکروسکوپ مورد بررسی قرار گیرند و از روی آن، بیماری تشخیص داده شود. پیگیر نتیجه نمونه‌برداری‌های خود باشید.

۹. گاهی لازم است بیمار ساعتی پس از انجام آندوسکوپی تحت نظر باشد. این موارد را در برنامه‌ریزی زمانی خود لحاظ کنید.

۱۰. درد گلو ناشی از آندوسکوپی ممکن است تا سه روز پس از آندوسکوپی ادامه پیدا کند، شما می‌توانید برای تسکین درد گلو از آبنبات مکیدنی یا غرغره سرم نرمال سالین گرم استفاده کنید.

۱۱. حدود ۲-۴ ساعت بعد از آندوسکوپی زمانی که بی حسی گلو برطرف گردید و قادر به بلع مواد غذایی شدید، می‌توانید از رژیم غذایی معمولی استفاده نمایید، ولی بهتر است که تا زمان برطرف شدن درد گلو از رژیم غذایی نرم استفاده نمایید.

۱۲. پس از انجام آندوسکوپی اگر دچار مشکلی نظیر خونریزی، درد بیش از حد، تهوع و استفراغ یا تب شدید، هر چه سریع‌تر مساله را با پزشک خود در میان بگذارید.

منابع:

آموزش به بیمار، ماری ام. کانابیو، ترجمه‌ی دکتر خدیجه نصیریانی، ۱۳۹۱
درستنامه‌ی داخلی جراحی گوارش، بروونر سودارت، ۲۰۱۴



بیمارستان حضرت آیت‌الله العظمی گلپایگانی (ره)
مدبریت خدمات پرستاری و مامانی



آندوسکوپی



آندوسکوپی

تهیه کننده:

واحد آموزش به بیمار و ارتقاء سلامت همگانی

www.golpayegani-h.ir

۰۲۵ ۳۶۱۶۱۱۱

مشکلات حین انجام آندوسکوپی معده

در طی انجام آندوسکوپی، اشکالات زیر ممکن است برای شما ایجاد شود:

- احساس فشار در گلو
- احساس ناراحتی در شکم
- زدن آروغ (به خاطر هوایی که به داخل معده فرستاده می شود). در هنگام داخل کردن نوک آندوسکوپ به سمت گلو، ممکن است شما یکی دوبار آروغ بزنید که این یک واکنش طبیعی می باشد.




۴

برای انجام آندوسکوپی، شما باید راحت بوده و بر روی سمت چپ خود دراز بکشید.

به گلوی شما یک اسپری بی حس کننده زده می شود تا چیزی احساس نکنید.

همچنین یک قطعه پلاستیکی کوچک محافظ در بین دندان های شما قرار داده می شود. این کار باعث میشود که دندان های شما آسیبی نبیند و نیز دندان های شما هم به آندوسکوپ صدمه نزند.

وقتی که شما آماده بودید، پزشک، سر آندوسکوپ را روی زبان شما قرار داده و آن را به سمت گلو می برد و از شما می خواهد که آن را قورت دهید، با این کار، مری باز شده و آندوسکوپ داخل آن می شود و سپس به سمت پایین و معده می رود.



۵

مراجعةه کننده ی گرامی ضمن خوش آمد گویی به شما که این مرکز را جهت درمان خود انتخاب نموده اید. این راهنمای جهت اطلاع رسانی به شما تهیه شده است.

آندوسکوپی

آندوسکوپی، دقیق ترین و مفیدترین راه برای بررسی عالی مشکلات گوارشی می باشد. لین آرطیش، بهترین راه تشخیص برای اتفاقی های ورزخی گوارشی و سرطان معده است. همچنین برای تشخیص عفونت های گویاکتریپاوری بسیار مفید می باشد.

شیوه انجام آندوسکوپی معده

آندوسکوپ، وسیله‌ای است که توسط آن می‌توان درون مری، معده و اثنی عشر (دوازدهه) را مشاهده نمود. انجام آندوسکوپی فقط به چند دقیقه وقت نیاز دارد. از آنجایی که لازم است در هنگام آندوسکوپی، معده شما خالی باشد، اگر قرار است آندوسکوپی در صبح انجام شود، شما باید بعد از خوردن شام، دیگر هیچ چیزی تا هنگام آندوسکوپی نخورید و به صورت ناشتا باشید. اگر هم قرار است آندوسکوپی در بعدازظهر انجام شود، شما باید بعد از اینکه یک صبحانه سبک میل نمودید، دیگر هیچ چیزی تا هنگام آندوسکوپی نخورید.

۱