



بیمارستان حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی (ره)
مدیریت خدمات پرستاری - آموزش به بیمار



مکالمه

انوکسایپارین (کلکسان)



تئیه کننده:
 واحد آموزش به بیمار و ارتقای سلامت همگانی

www.golpaygani-h.ir

۰۲۵ ۳۱۶ ۱۱۱۱

در چه مواردی به پزشک مراجعه شود

در صورت وقوع هر یک از علایم یا نشانه های زیر، مصرف دارو را قطع و بلاfaciale به پزشک خود مراجعه کنید:
کاهش هوشیاری، ضعف پاها، بی حسی یا گزگز شدن انتهایها، تب، بثورات پوستی، کهیر یا خارش، قرمزی یا تورم در ناحیه تزریق، خونریزی لشه ها، استفراغ خونی یا محتوی دانه های قهوه ای، مدفع خونی یا سیاه قیری شکل، ادرار خونی، ادرار قرمز یا قهوه ای تیره، اختلال کنترل ادرار یا مدفع، خونریزی قاعده ای شدید، خونریزی یا کبد شدگی غیرطبیعی انوکسایپارین ممکن است سبب ایجاد برخی عوارض ناخواسته گردد.

در صورت شدت یا بروز هر یک از علایم زیر با پزشک خود مشورت کنید:
تهوع، استفراغ، ناراحتی معده و اسهال



منابع:
کتاب داخلی و جراحی برونر و سودارت
better health

انوکسایپارین برای چه افرادی تزریق می شود؟

- BMI مساوی یا بیشتر از ۴۰ و چاقی
- سن بیش از ۳۵ سال
- سابقه بیش از سه بار سزارین
- استعمال دخانیات
- سابقه فشار بالا
- دو قلویی یا چند قلویی
- سابقه امبوی

مراقبت های لازم در استفاده از انوکسایپارین :

توجه در صورت فراموش کردن تزریق دارو بلاfaciale هنگام یادآوری تزریق شود و اگر به زمان تزریق دوز بعدی نزدیک می باشد دیگر تزریق نشود و از تزریق همزمان دو دوز باهم اجتناب کنید.

انوکسایپارین ممکن است سبب ایجاد برخی عوارض ناخواسته گردد. در صورت شدت یا بروز هر یک از علایم زیر با پزشک خود مشورت کنید: تهوع، استفراغ، ناراحتی معده و اسهال

مراحل تزریق:

۱) دستهای خود را با آب و صابون و بشوید و کاملاً خشک کنید.



۲) محل تزریق را با پنبه آغشته به الکل تمیز و اجازه دهید خشک شود.



۳) روی صندلی یا لبه تخت نشسته و یک چین پوستی اطراف ناف (فاصله ۵ سانتی متر از ناف) را بین انکشت اشاره و شست گرفته و آمپول را مستقیم عمود (زاویه ۹۰ درجه) وارد پوست کنید تا کامل دارو داخل پوست شود، چند ثانیه صبر کنید بعد سرخ را بیرون بکشید.





۴) محل تزریق را مالش ندهید.



دوش مصرف دارو:

تزرق انوکسایپارین بصورت عضلانی نبوده بلکه به صورت زیر جلدی است بدین معنی که دارو در چربی زیر پوست تزریق میشود و به صورت امپوله ای آماده جهت تزریق میباشد



عواض جانبی

- خونریزی از لثه و بینی بیش از دو دقیقه که قطع نشود.
- وجود خون در ادرار یا مدفوع
- استفراغ خونی
- تنگی نفس و طپش قلب
- خونریزی یا کبود شدگی محل عمل

انوکسایپارین یا کلکسان چیست؟

انوکسایپارین یا کلکسان یک داروی ضد انعقاد خون میباشد به این معنی که احتمال اینکه خون دچار انعقاد و لخته شود را کم می کند.

علل مصرف انوکسایپارین

علل شایع و متعددی برای ابتلاء به امبولی (لخته خون) وجود دارد که یکی از مهمترین دلایل ایجاد لخته خون در بیماران ایجاد لخته خون در رگ های عمقی پaha می باشد که در صورت عدم تشخیص و درمان آن باعث بروز لخته شده و در صورت حرکت لخته و توقف آن در رگ های حیاتی بدن مانند قلب، ریه و مغز بیمار، صدمات جبران ناپذیری را وارد میکند.

