


۹. به هیچ وجه با عضو کورتکس شده وزنه سنگین بلند نکنید.
۱۰. روی عضو کورتکس شده نخوابید.
۱۱. بعد از انجام دیالیز به مدت ۸ ساعت از دوش گرفتن و برداشتن پانسمان محل کورتکس خودداری کنید.
۱۲. در صورت خونریزی از محل سوزن مراقب باشید اطرافیان خود را آگاه نکنید.
۱۳. در صورت ریخته شدن خون بر روی دیوار یا کف اتاق، واپتکس رقیق شده روی آن بربیزید و پس از ۱۰ تا ۱۵ دقیقه محل آلوگی را با آب ساده شستشو نمایید.



مراجعةه کننده گرامی ضمن خوش آمد گویی به شما که این مرکز را جهت درمان خود انتخاب نموده اید. این راهنمای جهت اطلاع رسانی به شما تهیه شده است.



۱. هیچگاه اجازه ندهید از عضوی که کورتکس گذاشته شده فشار خون گرفته شود.
۲. اجازه ندهید عضوی که کورتکس گذاشته شده تزریق انجام شود.
۳. روزانه ۴ بار محل کورتکس خود را لمس و از کارآیی آن اطمینان حاصل کنید.
۴. روزانه نبض پا و دست را لمس کنید.
۵. بعد از جراحی عضوی را که کورتکس شده بالا نگه دارید.
۶. روزانه عضو کورتکس شده را حرکت و ورزش دهید.
۷. محل تزریق سوزن را از لحاظ خونریزی کنترل کنید.
۸. علائم و نشانه های عفونت، محل سوزن (قرمزی تورم و درد) را کنترل کنید.

بیمارستان حضرت آیت‌الله العظمی گلپایگانی (ره)
مدیریت خدمات پرستاری و مامائی



هر چیز

چگونه از کورتکس خود مراقبت کنیم؟



تهیه کننده:
واحد آموزش به بیمار و ارتقاء سلامت همگانی