

دروٹاچ هیدرولسل

۱. جراحی (هیدرولسلکتومی)

جراحی یا هیدرولسلکتومی از انواع درمان های هیدرولسل است. عمل جراحی (هیدرولسلکتومی) در هیدرولسل زمانی صورت میگیرد که هیدرولسل بعد از یکسال خود بخود رفع نشود و یا بزرگ شدن کیسه بیضه ادامه داشته باشد.

هیدرولسل اغلب در نوزادان بعد از یکسال خود بخود رفع می شود. در نوزادان به هیچ وجه مایع هیدرولسل نباید کشیده شود.

هیدرولسل می تواند در بزرگسالان نیز بطور خود بخود از بین بود و لی درمان زمانی صورت می گیرد که کیسه بیضه بزرگ شود.

به هر صورت روش اصلی درمان هیدرولسل به صورت جراحی (هیدرولسلکتومی) است و نیاز به بستره طولانی مدت ندارد.

برای این کار برشی بر روی کیسه بیضه یا پایین شکم ایجاد می کنند و با تخلیه سازی مایع اصلاحات لازم را انجام می دهد.

* ممکن است لوله تخلیه بر روی ناحیه برش تا چند روز بعد از جراحی قرار داده شود.

* تا ۲۴ ساعت بعد از عمل برای کاهش تورم، کیسه یخ بر روی موضع به صورت متناوب قرار داده می شود.

این مایع رفته رفته زیاد می شود، طوری که گاهی کیسه بیضه در افرادی که از مراجعه به پزشک خجالت می کشند، حجم بسیار بزرگی پیدا می کند.

در افرادی که دارای هیدرولسل هستند، در لمس، قوام بیضه مثل بادکنک است. هیدرولسل معمولاً بدون درد است و اگر خیلی بزرگ شود در فعالیت روزانه بیمار ایجاد اختلال میکند.

حل هیدرولسل

- * اکثر موارد علت خاصی نمی توان یافت.
- * در ۱۰ درصد موارد میتواند به علت عفونت بیضه، سرطان، ضربه به بیضه و یا سایر موارد اتفاق بیافتد.

دروٹنی نای تشخیصی

در بسیاری از موارد می توان با معاینه بالینی بیماری را تشخیص داد ولی گاهی جهت تأیید تشخیص و موارد مشکوک باید از تستهای پاراکلینیک استفاده کرد. بهترین اقدام پاراکلینیک، انجام سونوگرافی است. سونوگرافی از کیسه های بیضه نه تنها هیدرولسل بلکه سایر موارد مثل فتق و سرطان بیضه را به راحتی می تواند تشخیص دهد.

مراجعةه کننده ی گرامی ضمن خوش آمد گویی به شما که این مرکز را جهت درمان خود انتخاب نموده اید. این راهنمای جهت اطلاع رسانی به شما تهیه شده است.



هیدرولسل (آپ آوردن پیشمه)

"تجمع مایع در اطراف بیضه" را که توسط یکی از پوشش های بیضه ترشح می شود، هیدرولسل می نامند. هیدرولسل معمولاً بدون درد است. اگر قوام توده سفت باشد باید مشکوک به سرطان بیضه شد و بلافضله به پزشک مراجعت کرد. هیدرولسل در اکثر موارد یک بیماری بدون خطر بوده و مشکلی برای بیمار ایجاد نمی کند. هیدرولسل معمولاً یک طرفه است ولی گاهی نیز دو طرفه می باشد.

بیضه دارای یک پوشش بسیار نازک سروزی است که به طور مداوم مقداری مایع ترشح می کند تا سطح بیضه ها نرم باقی بمانند. این مایعی که ترشح می شود از طریق وریدها از بیضه خارج می گردد. حال اگر تعادل در میزان مایع ترشح شده و خارج شده از بیضه بر هم بخورد، مازاد آن در اطراف بیضه تجمع پیدا کرده و سبب هیدرولسل می شود.



بیمارستان حضرت آیت ا... العظمی گلپایگانی (ره)
مدیریت خدمات پرستاری و مامائی



هیدروسل



هیدروسل (آب آوردن بیضه)

Hydrocele

تهیه کننده:

واحد آموزش به بیمار و ارتقاء سلامت همگانی

www.golpayegani-h.ir

۰۲۵ ۳۶۱۶۱۱۱

نکات نهمن قاچاق ۸۴

- * هیدروسل در بالغین معمولاً یک بیماری خوش خیم است.
- * اگر در لمس، قوام کیسه بیضه سفت باشد (نه شبیه بادکنک) باید مشکوک به سلطان بیضه شد و بلافاصله به پزشک مراجعه کرد؛ و یا اگر هیدروسل به ناگهان ایجاد شده باشد، باید به وجود سلطان بیضه مشکوک شد.
- * برخلاف هیدروسل در بچه ها، بهبودی خود به خودی در هیدروسل بالغین وجود ندارد.
- * بهتر است قبل از این که اندازه هیدروسل بسیار بزرگ شده باشد، آن را عمل جراحی کرد.
- * عمل جراحی هیدروسل ساده و کم عارضه می باشد.



منبع:

داخلی و جراحی برونر و سودارت، کلیه و مجرای ادراری، ۲۰۱۰

۲. تخلیه مایع بیضه توسط سوزن

در این روش مایع تجمع یافته توسط یک سوزن تخلیه می شود ولی بدليل احتمال عود زیاد و عوارض احتمالی (عفونت و درد کیسه بیضه) توصیه نمی شود. این روش عمدتاً در افرادی انجام می شود که به علت بیماری های زمینه ای، خطر انجام عمل جراحی در آنها زیاد است.



آیا هیدروسل سبب ناباروری می شود؟

اگر هیدروسل به همراه بیماری های دیگر بیضه باشد شاید سبب ناباروری شود ولی خود هیدروسل به تنها یک عامل ناباروری نمی شود. در هیدروسل سریعاً به پزشک اورولوژی مراجعه کنید چرا که هرچه دیر اقدام شود، روند درمان طولانی تر می شود.