



آمادگی‌های لازم جهت انجام کلونوسکوپی (نوبت عصر)

فرم آموزش به بیمار و خانواده

ستان حضرت آیت‌الله العظمی کلبائینی (ره)

نام و نام خانوادگی:	تشخیص (علت بستری):	پزشک معالج:	تاریخ و ساعت مراجعه:
---------------------	--------------------	-------------	----------------------

روز قبل از کلونوسکوپی (۲۴ ساعت قبل):

- از خوردن غذاهای سفت و جامد و غذاهایی که تشکیل مدفوع می‌دهد جدا خودداری شود.
- برای صبحانه (یک کف دست نان با کمی مربا یا عسل)، ناهار و شام از آب گوشت و آب مرغ استفاده کنید.
- از رژیم مایعات فراوان (آب، آب عسل، چای، آب کمپوت) استفاده شود و از خوردن لبنیات و مایعات رنگی مثل آب هویج خودداری شود.
- *مصرف آب عسل در بیماران دیابتیک با احتیاط انجام شود.
- تا جای امکان همراه با مصرف زیاد آب، پیاده‌روی هم داشته باشید.
- لطفاً ۲ عدد شیاف ظهر و ۲ عدد شیاف شب استفاده نمایید.
- چهار بسته پودر پگ تهیه کرده و هرکدام را داخل ۴ لیوان آب جوشیده سرد شده حل کرده و از ظهر روز قبل از مراجعه هر ۱۵ دقیقه یک لیوان میل نمایید و حتماً همه چهار بسته پودر پگ مصرف شود.
- دو عدد قرص سیلاکس ظهر روز قبل و دو عدد غروب روز قبل مصرف شود.

روز انجام کلونوسکوپی:

- روز انجام کلونوسکوپی ناشتا باشید ولی مصرف مایعات تا ساعت ۷ صبح مشکلی ندارد و از ۷ صبح به بعد از مصرف آب نیز پرهیز شود.
- حتماً ۲ عدد شیاف بیزاکودیل صبح روز کلونوسکوپی گذاشته شود.
- یک بسته پودر پگ تهیه شده را هر کدام را در ۴ لیوان آب جوشیده سرد حل کرده و از ساعت ۶ صبح هر یک ربع یک لیوان میل شود و این کار تا ساعت ۷ صبح ادامه پیدا کند.
- دو عدد قرص سیلاکس ساعت ۷ صبح روز انجام کلونوسکوپی میل شود.
- حتماً با یک نفر همراه جهت انجام کلونوسکوپی مراجعه نمایید؛ چون این کار نیاز به بیهوشی دارد.
- حتماً در تاریخ و ساعت مقرر شده در محل حضور پیدا کنید.
- در صورت ابتلاء به بیماری‌های قلبی-عروقی- فشارخون حتماً داروهای مصرفی، حتی زمان ناشتا بودن هم طبق دستور پزشک معالج صبح زود با یک لیوان آب میل شود.
- در صورت ابتلا به بیماری‌های قلبی یا ریوی، از پزشک مربوطه برگه تاییدیه از نظر قلب یا ریه تهیه کرده و در روز انجام کلونوسکوپی همراه بیاورید.
- باهمراهی با پزشک خود حداقل ۵ روز قبل از انجام کلونوسکوپی، از مصرف قرص‌های رقیق کننده خون مانند آسپرین و اسویکس (پلاویکس) خودداری نمایید.
- در صورت مصرف داروهای دیابت (قند) داروها صبح روز انجام کلونوسکوپی استفاده نشود.
- خانم‌ها در صورت داشتن زیورآلات (ساعت، انگشتر و هر نوع شیء فلزی) حتماً درآورده و بدون زیورآلات مراجعه فرمایید.
- عوارض احتمالی انجام کلون سکوپ: عفونت، خونریزی، سوراخ شدگی یا پارگی مجرای گوارش می‌باشد.

داروهای مورد نیاز جهت انجام کلونو سکوپ:

- الف) پنج بسته پودر پیدرولاکس (پودر پگ)
ب) ۶ عدد شیاف بیزاکودیل
ج) شش عدد قرص سیلاکس

تلفن تماس واحد کلونوسکوپی: ۰۲۵-۳۶۱۶۱۲۲۸

الترجمه العربيه : ارسل انه قولون للرقم ۳۰۰۰۸۵۳۶۳۶۱۶۱۱۱

مراجعة کننده محترم:

لطفاً اینترنت گوشی خود را روشن نموده و با دوربین گوشی بارکد روبرو را اسکن کنید.

و یا عدد ۲۳۰ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۵۳۶۳۶۱۶۱۱۱ ارسال نمایید.



بارکد سایت بیمارستان



البارکود الترجمة العربية